

Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами)

Найменування предмета закупівлі	Посилання на Prozorro	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>ДК 021:2015 код 33600000-6 Фармацевтична продукція (Поставка медикаментів для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")</p>	<p>UA-2024-11-25-009934-a</p>	<p>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 33600000-6 Фармацевтична продукція (Поставка медикаментів для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго"): забезпечення продукцією для надання першої медичної допомоги працівникам філії при невідкладних станах та забезпеченням медикаментами цехових та офісних аптек, виникла необхідність в закупівлі даного виду товару.</p> <p>Також для обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі враховані відповідні до чинного законодавства України нормативно правові документи та стандарти, які були використані при складанні технічного завдання:</p> <p>Технічні характеристики:</p> <p>Адреналіна р-р д/ін. 0,18% амп. 1мл №10: діюча речовина: рінергіне; 1 мл розчину містить епінефрину гідрогартрату (адреналіну артрату) 1,82 мг; допоміжні речовини: натрію метабісульфіт (Е 223), натрію хлорид, вода для ін'єкцій.</p> <p>Алерзин табл. 5мг №14 : діюча речовина: левоцетиризину дигідрохлорид; 1 таблетка містить 5 мг левоцетиризину дигідрохлориду (що відповідає 4,21 мг левоцетиризину); допоміжні речовини: целюлоза кременіва мікрокристалічна, гідроксипропілцеллоза низькозаміщена, лактози моногідрат, магнію стеарат;</p> <p>Аміаку розчин 10% фл. 40мл №1(1) : діюча речовина: 100 мл препарату містить: аміаку розчину концентрованого (у вигляді 25 % розчину) 44 мл; допоміжна речовина: вода очищена.</p> <p>Амінокапронова к-та р-н д/інф. 5% фл. 100мл№1 Інфузія: діюча речовина: кислота амінокапронова; 1 мл розчину містить кислоти амінокапронової 50 мг; допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.</p> <p>Аурідексан кр. вуш. 0,5мг/мл фл. 5мл №1 діюча речовина: desamethoxine; 1 мл розчину містить декаметоксину у перерахуванні на 100 % речовину 0,5 мг; допоміжна речовина: етанол (70 %).</p> <p>Анальгін р-н д/ін. 50% амп. 2мл №10 - діюча речовина: metamidazole sodium; 1 мл розчину містить метамізолу натрію (анальгін) 500 мг;</p> <p>допоміжні речовини: натрію сульфат безводний (Е 221), натрію формальдегід сульфоксилат дигідрат, кислота хлористоводнева розведена, вода для ін'єкцій.</p> <p>Анальгін табл. 0,5г №10 Дарниця1 діюча речовина: metamidazole sodium; 1 таблетка містить метамізолу натрію (анальгін) 500 мг; допоміжні речовини: крохмаль картопляний, тальк, кальцію стеарат.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 33600000-6 Фармацевтична продукція (Поставка медикаментів для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") здійснено в порівняльному аналізі цін (Додаток № 1) на підставі отриманих цінових пропозицій:</p> <p>ПП Соломія-Сервіс (Цінова пропозиція № 1123 від 17.10.2024 р.) Додаток №2.</p> <p>ТОВ Подорожник Чернівці (Цінова пропозиція № 1539 від 17.10.2024 р.) Додаток №3</p> <p>ТОВ ІВА-ФАРМ (Цінова пропозиція № 1209 від 17.10.2024 р.) Додаток №4.</p>

Ангіноаг спрей фл. 20мл №1 – діючі речовини: dequalinium chloride, tyrothricin, epiholone (β-glucosylthietinic acid), hydrocortisone acetate, lidocaine hydrochloride; 1 мл спрею містить: деквалінію хлориду 1 мг; тиротрицину 4 мг; еноксолону (β-гліцирретинової кислоти) 0,6 мг; гідрокортизону ацетату 0,6 мг; лідокаїну гідрохлориду 1 мг; допоміжні речовини: пропіленгліколь, олія ананасова, сахарин натрію, етанол 96 % (об/об).

Атропіна сульфат р-н д/ін. 0.1% амп. 1мл №10 - діюча речовина: atropine; 1 мл розчину містить атропіну сульфату 1 мг; допоміжні речовини: 0,1 М хлористоводнева кислота, вода для ін'єкцій.

Амоксил-КМП табл. 0,5г №20 – діюча речовина: amoxicillin; 1 таблетка містить амоксициліну тригідрату, у перерахуванні на амоксицилін – 250 мг або 500 мг; допоміжні речовини: натрію крохмальгліколят (тип А), повідон, кальцію стеарат.

Ацетилсаліцилова к-та табл. 0,5г №10(1) – діюча речовина: acetylsalicylic acid; 1 таблетка містить ацетилсаліцилової кислоти 500 мг; допоміжні речовини: кислота лимонна моногідрат, крохмаль картопляний.

Баралгін р-н д/ін. амп. 5мл №5 – діючі речовини: метамізол натрію, пітофенону гідрохлорид; фенпіверинію бромід; 1 мл розчину містить: метамізолу натрію моногідрату 500 мг; пітофенону гідрохлориду 2 мг; фенпіверинію броміду 0,02 мг; допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.

Барбовал капс. тв. №30 – діючі речовини: етиловий ефір α-бромізовалеріанової кислоти, розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової, фенобарбітал; 1 капсула містить: етилового ефіру α-бромізовалеріанової кислоти – 10 мг, розчину ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової – 46 мг, фенобарбіталу – 9,8 мг; допоміжні речовини: олія рицинова, лактози моногідрат (200), целюлоза мікрокристалічна 102, кросповідон, кальцію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний.

Барбовал кр. орал. фл. 25мл №1 – діючі речовини: етиловий ефір α-бромізовалеріанової кислоти, ментол в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової, фенобарбітал; 1 мл розчину містить етилового ефіру α-бромізовалеріанової кислоти у перерахуванні на 100 % речовину 18 мг, розчину ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової (валідолу) 80 мг, фенобарбіталу 17 мг; допоміжні речовини: натрію ацетату тригідрат, етанол (96 %), вода очищена.

Бесалол табл. №6 – діючі речовини: 1 таблетка містить красавки (беладони) екстракту густого (6 :1) (екстрагент – етанол 20 %) 10 мг, фенілсаліцилату 300 мг; допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; целюлоза мікрокристалічна; натрію кроскармелоза; кислота стеаринова.

Бетадин р-н фл. 120мл №1 – діюча речовина: повідон-йод; 1 мл розчину містить 100 мг повідон-йоду; допоміжні речовини: гліцерин (85 %), моноксинол 9, кислота лимонна безводна, натрію гідрофосфат безводний, натрію гідроксид, вода очищена.

Бетаспан р-н д/ін. 4мг/мл амп. 1мл №5 – діюча речовина: betamethasone; 1 мл розчину містить бетаметазону натрію фосфату – 5,3 мг у перерахуванні на бетаметазон 100 % речовину – 4 мг;

допоміжні речовини: динатрію едетат, натрію гідрофосфату дигідрат, кислота фосфорна концентрована, вода для ін'єкцій.

Бісопрол табл. 2,5мг №20 – діюча речовина: бісопролол; 1 таблетка містить бісопрололу фумарату 2,5 мг; допоміжні речовини: кальцію гідрофосфат безводний; целюлоза мікрокристалічна; крохмаль кукурудзяний; кросповідон; кремнію діоксид колоїдний безводний; магнію стеарат; суха суміш «Opadry white», що містить титану діоксид (E 171), гіпромелозу, триацетин.

Бруфен Ретард табл. п/о 800мг №14 – діюча речовина: ібупрофен;

1 таблетка містить ібупрофену 800 мг; допоміжні речовини: ксантанова камедь, повідон, кислота стеаринова, кремнію діоксид колоїдний безводний; оболонка таблетки: гіпромелоза, тальк, титану діоксид (E 171).

Валеріани екстракт табл. 20мг №50 – діюча речовина: 1 таблетка містить валеріани екстракту густого (*valerianaе extractum spissum*) екстрагент етанол (40 %) в перерахунку на суху речовину 20 мг; допоміжні речовини: лактоза моногідрат, магнію карбонат важкий, натрію кроскармелоза, кислота стеаринова, олія рицинова, тальк; оболонка для покриття: магнію карбонат важкий, цукор, гіпромелоза, тальк, повідон, титану діоксид (E 171), кремнію діоксид колоїдний безводний, віск бджолиний, парафін, олія соняшникова, тартразин (E 102).

Валеріани н-ка фл. 25мл №1(1) – 1 флакон містить настойки кореневищ з коренями валеріани (*Rhizomata cum radicibus Valerianaе*) (1:5) (екстрагент етанол 70 %)–25 ml (мл)

Валідол табл. 0,06г №10 Дарниця – діюча речовина: розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової; 1 таблетка містить розчину ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової 60 мг;

допоміжні речовини: цукор кристалічний, кальцію стеарат.

Верошпірон капс. 50мг N30 – діюча речовина: спіронолактон;

1 капсула містить 50 мг або 100 мг спіронолактону; допоміжні речовини вмісту капсули: натрію лаурилсульфат; магнію стеарат; крохмаль кукурудзяний; лактози моногідрат; тверді желатинові капсули 50 мг: верхня частина капсули: хіноліновий жовтий (E 104), титану діоксид (E 171), желатин; нижня частина капсули: титану діоксид (E 171), желатин.

Вугілля активоване табл. 250мг №10 Моя Аптечка – 1 таблетка містить: активний інгредієнт: вугілля активоване порошкоподібне – 250 мг (mg); допоміжні речовини: крохмаль картопляний, антиспекуючий агент: тальк.

Глюкоза р-н д/ін. 40% ампл. 20мл №10 Фармак – діюча речовина: glucose; 1 мл розчину містить глюкози моногідрату 400 мг; допоміжні речовини: натрію хлорид, кислота хлористоводнева розведена, вода для ін'єкцій.

Глутаргін р-н д/ін. 40% амп. 5мл №10 –діюча речовина: arginine glutamate; 1 мл препарату містить аргініну глутамату 400 мг; допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.

Гідазепам ІС 0,02г табл. №20 – діюча речовина: gidazeram; 1 таблетка містить гідазепаму 20 мг (0,02 г) або 50 мг (0,05 г); допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, повідон.

Декасан р-н 0,02% фл. 100мл №1 –діюча речовина: декаметоксин;

1 мл розчину містить 0,2 мг декаметоксину; допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.
Дексалгін р-н д/ін. 50мг/2мл амп. 2мл №5 –діюча речовина: декскетопрофену трометамол; 1 мл розчину для ін'єкцій/інфузій містить декскетопрофену трометамолу 36,9 мг, що еквівалентно декскетопрофену 25 мг (одна ампула по 2 мл містить декскетопрофену трометамолу 73,8 мг, що еквівалентно декскетопрофену 50 мг); допоміжні речовини: етанол 96 %, натрію хлорид, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Дексаметазон 4 мг амп. 1мл №5(1) – діюча речовина: dexamethasone;

1 мл розчину містить дексаметазону натрію фосфату 4 мг; допоміжні речовини: динатрію фосфат додекагідрат, калію дигідрофосфат, гліцерин, спирт бензиловий, динатрію едетат (трилон Б), вода для ін'єкцій.

Димедрол-Дарниця р-н 1% амп. 1мл №10 – діюча речовина: diphenhydramine; 1 мл розчину містить дифенгідраміну гідрохлориду 10 мг; допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.

Дибазол-Дарниця 1% амп. 5,0 №10 – діюча речовина: bendazol; 1 мл розчину містить бендазолу гідрохлориду 10 мг; допоміжні речовини: етанол 96 %, гліцерин, хлористоводнева кислота, вода для ін'єкцій.

Диклодев р-н д/ін. 25мг/мл амп. 3мл №5 – діюча речовина: diclofenac; 3 мл розчину містять 75 мг диклофенаку натрію (25 мг/мл);

допоміжні речовини: натрію метабісульфіт (Е 223), маніт (Е 421), спирт бензиловий, натрію гідроксид, пропіленгліколь, вода для ін'єкцій.

Диклофенак р-н д/ін. 2,5% амп. 3мл №10 – діюча речовина: diclofenac; 1 мл розчину містить диклофенаку натрію 25 мг; допоміжні речовини: маніт (Е 421), натрію метабісульфіт (Е 223), спирт бензиловий, пропіленгліколь, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Дицинон р-н д/ін. 250мг/2мл амп. №50 – діюча речовина: етамзилат;

1 ампула (2 мл розчину) містить етамзилату 250 мг; допоміжні речовини: натрію метабісульфіт (Е 223), натрію гідрокарбонат, вода для ін'єкцій.

Еглоніл 100мг/2мл амп. 2мл №6 – діюча речовина: сульпірид; 2 мл розчину містять сульпіриду 100 мг; допоміжні речовини: кислота сірчана фармацевтичного ступеня чистоти, натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Елеутерока екстракт фл. 50мл №1 – діюча речовина: рідкий екстракт кореневищ з коренями елеутерококу колючого (*Eleutherococcus senticosus*) (1:1) (екстрагент – етанол 40 %); 1 флакон містить рідкого екстракту кореневищ з коренями елеутерококу колючого (*Eleutherococcus senticosus*) (1:1) (екстрагент – етанол 40 %) 20 мл, 25 мл, 30 мл або 50 мл.

Еуфілін р-н д/ін. 20мг/мл амп. 5мл №10 – діюча речовина: theophylline; 1 мл розчину містить теофіліну 20 мг; допоміжні речовини: натрію ацетат тригідрат, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій. Ентеросгель екстракапс. 320мг №14 – діюча речовина: ксерогель поліметилсилоксану; 1 капсула містить ксерогель поліметилсилоксану 0,32 г; допоміжні речовини: желатин, титану діоксид (E 171).

Ентероспазміл Н капс. №30 (10*3) – 1 капсула містить: активні інгредієнти: симетикону – 130 мг, флороглюцинолу дигідрату - 75 мг; допоміжні речовини: наповнювач: целюлоза мікрокристалічна, антиспікаючі агенти: кремнію двоокис аморфний, магнецію стеарат; оболонка капсули: желатин, титану двоокис (E 171). Без ГМО.

Ізо-мік спреї 1,25мг/доза 300 доз фл. 15мл №1 – діюча речовина: isosorbide dinitrate; 1 доза спрею містить ізосорбїду динітрату водного (у перерахунку на 100 % ізосорбїду динітрат) – 1,25 мг; допоміжні речовини: макрогол-400; етанол 96 %.

Імодіум капс. 2мг N20 – діюча речовина: loperamide; 1 капсула містить 2 мг лоперамїду гідрохлориду; допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль кукурудзяний, тальк, магнецію стеарат; оболонка капсули: заліза оксид жовтий (E 172), заліза оксид чорний (E 172), титану діоксид (E 171), індігокармін (E 132), еритрозин (E 127), желатин.

Індоколлїр кр. оч. 0,1% фл. 5мл №1 – діюча речовина: індометацин;

1 мл розчину містить 1 мг індометацину; допоміжні речовини: тіомерсал, аргїнін, гідроксипропіл-бета-циклодекстрин, кислота хлористоводнева розведена, вода очищена.

Іхтіолова мазь 10% туба 30г №1 – діюча речовина: іхтіол; 1 г мазі містить 0,1 г іхтіолу; допоміжна речовина: парафїн білий м'який.

Йод-Вішфа спирт. р-н 5% фл. 20мл №1 – діюча речовина: йод; 100 мл розчину містять йоду 5 г; допоміжні речовини: калїю йодид, етанол 96 %, вода очищена.

Кальцію глюконат 10% амп. 10мл №10 – діюча речовина: calcium gluconate; 1 мл розчину містить: кальцію глюконату 85 мг, кальцію леулінату 10 мг; допоміжні речовини: calcium gluconate; 1 мл розчину містить: хлористоводнева розведена, вода для ін'єкцій. 1 мл препарату містить 9,706 мг сумарного кальцію (Ca²⁺), що в перерахунку на теоретичний вміст кальцію глюконату еквівалентно 100 мг/мл.

Корглїкон р-н д/ін. 0,06% амп. 1мл №10 – діюча речовина: 1 мл розчину містить корглїкону 0,6 мг; допоміжні речовини: хлоробутанол гемїгідрат, вода для ін'єкцій.

Кандибіотик кр. вуш. фл. 5мл №1 – діючі речовини: клотримазол, клотримазол, беклометазону дипропіонат, лідокаїну гідрохлорид; 1 мл розчину містить клотримазолу 50 мг, клотримазолу 10

мг, беклометазону дипропіонату 0,25 мг, лідокаїну гідрохлориду 20 мг; допоміжні речовини: гліцерин, пропіленгліколь.

Каптопрес-Д табл. 25мг N20 – діючі речовини: sartopril, hydrochlorothiazide; 1 таблетка містить каптоприлу 50 мг, гідрохлоротіазиду 25 мг; допоміжні речовини: крохмаль картопляний, лактоза моногідрат, кремнію діоксид колоїдний безводний, повідон, магнію стеарат.

Корвалмент капс. 0,1г №80 – діюча речовина: розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової; 1 капсула містить розчину ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової 100 мг; допоміжні речовини: желатин, гліцерин.

Корвалол-Дарниця фл. 25мл №1 – діючі речовини: етиловий ефір α -бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал, олія м'яти перцевої; 1 мл препарату містить: етилового ефіру α -бромізовалеріанової кислоти, у перерахуванні на 100 % речовину 20,0 мг, фенобарбіталу 18,26 мг, олії м'яти перцевої 1,42 мг; допоміжні речовини: етанол 96 %, калію ізовалерат, вода очищена.

Кордіамін р-н д/ін. 25% амп. 2мл №10 здор. – діюча речовина: 1 мл розчину містить нікетаміду 250 мг; допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.

Кофеїн-бензоат Na р-н д/ін. 10% амп. 1мл №10 – діючі речовини: 1 мл розчину містить кофеїну-бензоату натрію 100 мг; допоміжні речовини: натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Кремген мазь туба 15г №1 – діючі речовини: флуоцинонід, гентаміцин; 1 г мазі містить флуоциноніду 0,5 мг, гентаміцину сульфату 1 мг у перерахуванні на гентаміцин; допоміжні речовини: пропіленгліколь; поліетиленгліколь 4000; спирт стеариловий; гліцерин; кислота лимонна, моногідрат; диметикон.

Л-лізіна есцинат р-н д/ін. 0,1% амп. 5мл №10 – діюча речовина: есцинова сіль 2,6-діаміногексанової кислоти; 1 мл розчину містить есцинової солі 2,6-діаміногексанової кислоти, в перерахуванні на 100 % речовину 1,0 мг; допоміжні речовини: етанол 96 %, пропіленгліколь, вода для ін'єкцій.

Лазикс Нео р-н д/ін. амп. 2мл №10 – діюча речовина: фуросемід; 1 мл розчину містить фуросеміду 10 мг; допоміжні речовини: натрію гідроксид, натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лідокаїна гідрохл. р-н д/ін. 2% амп. 2мл N10 Дарниця – діюча речовина: лідокаїну гідрохлорид; 1 мл розчину містить лідокаїну гідрохлориду, в перерахуванні на безводну речовину 20 мг; допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Левоміцетин кр. оч. 0,25% фл. 10мл №1 – діюча речовина: 1 мл препарату містить 2,5 мг хлорамфеніколу; допоміжні речовини: кислота борна, вода для ін'єкцій.

Лідоксан лимон спрей 2мг/0,5мл фл. 30мл №1 – діючі речовини: хлоргексидину диглюконат, лідокаїну гідрохлорид; 1 мл препарату містить хлоргексидину диглюконату 2 мг, лідокаїну гідрохлориду 0,5 мг; допоміжні речовини: кислота лимонна, моногідрат; цукралоза; лимонний ароматизатор; пропіленгліколь; гліцерин; етанол 96%; вода очищена.

Лізиноприл-Тева табл. 5мг №60 – діюча речовина: лізиноприл; 1 таблетка містить лізиноприлу 5 мг або 10 мг, або 20 мг у вигляді лізиноприлу дигідрату; допоміжні речовини: маніт (E 421), кальцію гідрофосфат, крохмаль кукурудзяний прежелатинізований, натрію кроскармелоза, магнію стеарат; для таблеток по 10 мг та 20 мг заліза оксид жовтий (E 172), заліза оксид чорний (E 172), заліза оксид червоний (E 172).

Ліпразид табл. 10мг №30 – діючі речовини: лізиноприл та гідрохлортиазид; 1 таблетка Ліпразиду 10 містить лізиноприлу (у перерахуванні на 100 % безводний лізиноприл) – 10 мг, що відповідає лізиноприлу дигідрату – 10,89 мг та гідрохлортиазиду (у перерахуванні на 100 % суху речовину) – 12,5 мг; допоміжні речовини: Ліпразид 10 – маніт (E 421), крохмаль кукурудзяний, магнію стеарат, заліза оксид жовтий (E 172), кальцію гідрофосфату дигідрат.

Лоратадин табл. 10мг №10 Баум Фарм - діюча речовина: loratadine; 1 таблетка містить лоратадину 10 мг; допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, лактоза моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію кроскармелоза, магнію стеарат.

Магнію сульфат р-н д/ін. 25% амп. 5мл №10 КМП – діюча речовина: magnesium sulfate heptahydrate; 1 мл розчину містить магнію сульфату гептагідрату 250 мг; допоміжні речовини: вода для ін'єкцій, кислота хлористоводнева.

Метоклопрамід р-н д/ін. 0,5% амп. 2мл №10 - діюча речовина: metoclopramide; 1 мл розчину містить метоклопраміду гідрохлориду 5 мг; допоміжні речовини: натрію хлорид, динатрію едетат, натрію сульфат безводний (E 221), пропіленгліколь, кислота хлористоводнева розведена, вода для ін'єкцій.

Мефенамінова кислота табл. 500мг № 20 –діюча речовина: мефенамінова кислота; 1 капсула містить мефенамінової кислоти 250 мг або 500 мг; допоміжні речовини: капсули по 500 мг: тальк, кислота стеаринова, крохмаль кукурудзяний, натрію лаурилсульфат, кросповідон.

Мілістан мультисимпт. капл. п/о №12 – діючі речовини: 1 каплет містить парацетамолу 325 мг, цетиризину гідрохлориду 10 мг, хлорфеніраміну малеату 2 мг, декстрометорфану гідроброміду 15 мг;

допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, целюлоза мікрокристалічна, метилпарабен (E 218), пропілпарабен (E 216), магнію стеарат, тальк, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію лаурилсульфат, натрію крахмальгліколят (тип А), гіпромелоза, пропіленгліколь, поліетиленгліколь 4000, титану діоксид (E 171).

Натрію тіосульфат р-н д/ін. 30% амп. 5мл №10 Дарниця – діюча речовина: sodium thiosulfate; 1 мл розчину містить натрію тіосульфату 300 мг; допоміжні речовини: натрію гідрокарбонат, динатрію едетат, вода для ін'єкцій.

Натрію хлорид р-н д/ін. 0,9% амп. 10мл N10 Галичфарм – діюча речовина: натрію хлорид; 1 мл розчину містить натрію хлориду 9 мг;

допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.
Натрію хлорид р-н д/інф. 0,9% фл. 100мл №1 – діюча речовина: натрію хлорид; 1 мл розчину містить натрію хлориду 9,0 мг;
допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.
Натрію хлорид р-н д/інф. 0,9% фл. 200мл №1 Галичфарм – діюча речовина: натрію хлорид; 1 мл розчину містить натрію хлориду 9,0 мг;
допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.
Німесил пор. д/приг. орал. сусп. пак. №30 – діюча речовина: німесулід; 1 однодозовий пакет по 2 г гранул містить німесулід 100 мг; допоміжні речовини: макрогону цетостеариловий ефір, сахароза, мальтодекстрин, кислота лимонна безводна, апельсиновий ароматизатор.
Но-шпа р-н д/ін. 40мг амп. 2мл №25 – діюча речовина: drotaverine;
1 мл розчину містить дротаверину гідрохлориду 20 мг; допоміжні речовини: натрію метабісульфіт, етанол 96 %, вода для ін'єкцій.
Нефам р-н д/ін. 10мг/мл амп. №5 – діюча речовина: нефопаму гідрохлорид; 1 мл розчину містить нефопаму гідрохлориду 10 мг;
допоміжні речовини: натрію дигідрофосфат, дигідрат; натрію гідрофосфат, додекагідрат; вода для ін'єкцій.
Но-шпа форте 80мг табл. №24 – діюча речовина: дротаверин;
1 таблетка містить дротаверину гідрохлориду 80 мг; допоміжні речовини: магнею стеарат, тальк, повідон, крохмаль кукурудзяний, лактози моногідрат.
Новокаїн р-н д/ін. 2% амп. 2мл N10 – діюча речовина: prilocaine;
1 мл розчину містить новокаїну (прокаїну гідрохлориду) 20 мг; допоміжні речовини: кислота хлористоводнева, вода для ін'єкцій.
Омепразол капс. 20мг №30 Новий Баум Фарм – діюча речовина: omeprazole; 1 капсула містить омепразолу пелети (у перерахуванні на омепразол) 20 мг; допоміжні речовини: маніт (E 421), гіпромелоза, метакрилатного сополімеру дисперсія, натрію лаурилсульфат, натрію гідрофосфат безводний, діетилфталат, сахароза, титану діоксид (E 171), повідон, кальцію карбонат, тальк, полісорбат-80, натрію гідроксид.
Офлокаїн-Дарниця мазь 30г – діючі речовини: lidocaine hydrochloride, ofloxacin; 1 г мазі містить: офлоксацину 1 мг, лідокаїну гідрохлориду 30 мг; допоміжні речовини: пропіленгліколь, полоксамер, макрогол 400, макрогол 1500, макрогол 6000.
Панкреатин форте табл. №50 Вітаміни – діюча речовина: панкреатин; 1 таблетка містить панкреатину, що відповідає мінімальній ферментативній активності: 4500 амілолітичних ОД Ph. Eur.; 6000 ліполітичних ОД Ph. Eur.; 300 протейолітичних ОД Ph. Eur.;

допоміжні речовини: лактоза, моногідрат, натрію хлорид, кальцію стеарат; натрію кроскармеллоза; повідон; кремнію діоксид колоїдний безводний; триетилцитрат; акрил-із білий 93A18597 (суміш сухих речовин: метакрилатний сополімер (тип C); тальк; титану діоксид (E 171); кремнію діоксид колоїдний безводний; натрію гідрокарбонат; натрію лаурилсульфат).

Паллада кр. оч. 0,1% фл. 5 мл №1 – діюча речовина: олопатадин;

1 мл розчину містить олопатадин (у формі гідрохлориду) 1 мг; допоміжні речовини: бензалконію хлорид, натрію гідрофосфат безводний, натрію хлорид, натрію гідроксид або кислота хлористоводнева розведена, вода для ін'єкцій.

Папаверину г/х р-н д/ін. 2% амп. 2мл №10 – діюча речовина: papaverine; 1 мл розчину містить папаверину гідрохлориду 20 мг; допоміжні речовини: динатрію едетат, метіонін, вода для ін'єкцій.

Перекису водню р-н 3% фл. 40мл №1 – діюча речовина: водню пероксид; 100 мл розчину містять водню перекису (30 %) 10,0 г; допоміжні речовини: натрію бензоат (E211), вода очищена.

Перекису водню р-н 3% фл. 100мл пластик №1 – діюча речовина: водню пероксид; 100 мл розчину містять водню перекису (30 %) 10,0 г; допоміжні речовини: натрію бензоат (E211), вода очищена.

Платифілін-Дарниця р-н д/ін.0,2% амп. 1мл №10 – діюча речовина: platyphylline hydrochlorate; 1 мл розчину містить платифіліну гідротартрату 2 мг; допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.

Преднізолон р-н д/ін. 30мг/мл амп. 1мл №5 Дарниця – діюча речовина: prednisolone; 1 мл розчину містить преднізолону натрію фосфату в перерахуванні на преднізолон 30 мг; допоміжні речовини: динатрію едетат, динатрію фосфат додекагідрат, калію дигідрофосфат, етанол 96 %, пропіленгліколь, вода для ін'єкцій.

Реммакс табл. д/жув. №18 м'ята – діючі речовини: кальцію карбонат, магнію карбонат; 1 таблетка містить кальцію карбонату 680 мг, магнію карбонату важкого 80 мг; допоміжні речовини: таблетки з м'ятним смаком: сорбіт (E 420), крохмаль прежелатинізований, крохмаль картопляний, тальк, магнію стеарат, олія мінеральна легка, ароматизатор «м'ятний смак», сахарин натрію;

Реосорбілакт р-н д/інф. фл. 200мл №1 – діючі речовини: 1 мл розчину містить сорбітолу 60,0 мг, натрію лактату (у перерахунку на 100 % речовину) 19,0 мг, натрію хлориду 6,0 мг, кальцію хлориду дигідрату (у перерахунку на кальцію хлорид) 0,1 мг, калію хлориду 0,3 мг, магнію хлориду гексагідрату (у перерахунку на магнію хлорид) 0,2 мг; допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.

Ранітидин табл. п/о 150мг №20 – діюча речовина: ranitidine; 1 таблетка містить: ранітидину гідрохлориду у перерахуванні на ранітидин 150 мг; допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, повідон, лактоза моногідрат, картопляний крохмаль, тальк, магнію стеарат, опадрай АМВ 80 W жовтий.

Сиднофарм табл. 2мг №30 – діюча речовина: молсидомін; 1 таблетка містить молсидоміну 2 мг; допоміжні речовини: лактози моногідрат, маніт (E 421), крохмаль пшеничний, целюлоза

мікрокристалічна, гіпромелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, олія м'яти перцевої, жовтий захід FCF (E 110).

Септефрил табл. 0.2мг №10 – діюча речовина: desamethoxine; 1 таблетка містить декаметоксину 0,2 мг; допоміжні речовини: цукор кристалічний, кальцію стеарат.

Септил плюс р-н 96% фл. 100мл №1 – діюча речовина: етанол; 100 мл розчину містить: не менше 95,1 % і не більше 96,9 % етанолу за об'ємом.

Солпадеїн Актив табл. шип. №12 – діючі речовини: парацетамол, кофеїн; 1 таблетка містить 500 мг парацетамолу, 65 мг кофеїну; допоміжні речовини: сорбіт (E 420), сахарин натрію, натрію гідрокарбонат, повідон, натрію лаурилсульфат, диметикон, кислота лимонна безводна, натрію карбонат безводний.

Сорбекс капс. №20 – діюча речовина: вугілля активоване; 1 капсула містить вугілля активованого 0,25 г; допоміжні речовини: желатин, заліза оксид чорний (E 172), діамантовий чорний (E 151).

Спазмалгон табл. №20 – діючі речовини: метамізол натрію, пітофенону гідрохлорид, фенпіверинію бромід; 1 таблетка містить метамізолу натрію 500 мг, пітофенону гідрохлориду 5 мг, фенпіверинію броміду 0,1 мг; допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль пшеничний, тальк, магнію стеарат, желатин, натрію гідрокарбонат.

Сульфацил натрію кр. оч. 30% фл. 10мл №1 – діюча речовина: 1 мл розчину містить 300 мг сульфацил натрію; допоміжні речовини: натрію тіосульфат, вода для ін'єкцій, кислота хлористоводнева (для доведення рН).

Супрастин р-н д/ін. амп. 1мл N5 – діюча речовина: хлоропірамін;

1 мл містить 20 мг хлоропіраміну гідрохлориду; допоміжні речовини: вода для ін'єкцій.

Тизин Ксило спрей назал. 0,1% фл. 10мл №1 – діюча речовина: xylometazoline hydrochloride; 1 мл розчину містить 0,5 мг або 1 мг ксилометазоліну гідрохлориду; допоміжні речовини: бензалконію хлориду розчин; сорбіту розчин, що не кристалізується (E 420); натрію хлорид; натрію дигідрофосфат, дигідрат; натрію гідрофосфат, дигідрат; динатрію едетат; вода очищена.

Трахісан табл. д/розсмок. №20 – діючі речовини: тиротрицин, лідокаїну гідрохлорид моногідрат, хлоргексидину диглюконат; 1 таблетка містить тиротрицину 0,5 мг, лідокаїну гідрохлориду моногідрату 1 мг, хлоргексидину диглюконату 1 мг; допоміжні речовини: сорбіт (E 420), магнію стеарат, олія м'яти перцевої; 1 таблетка містить 0,69 г сорбіту (цукрозамінної речовини), що відповідає 0,057 хлібною одиниці.

Карвеліс фл. 50мл №1 - діючі речовини: 10 мл препарату містять: екстракт із суміші листя, квітів і плодів глоду (*Crataegi folii cum flore, fructus extractum*) (1:1,6-2,2), екстрагент: етанол 50 % (об/об) – 7,125 мл; екстракт трави собачої кропиви (*Leonuri herbae extractum*) (1:1,7-2,2), екстрагент: етанол 40 % (об/об) – 1,0 мл; екстракт листя меліси (*Melissae herbae extractum*) (1:1,6-2,1), екстрагент:

етанол 60 % (об/об) – 1,0 мл; екстракт кореня валеріани (*Valeriana radix extractum*) (1:1,6–2,1), екстрагент: етанол 60 % (об/об) – 0,5 мл; допоміжні речовини: сахароза, вода очищена.

Тринефрон капс. №60 – діючі речовини: 1 капсула містить подрібненої лікарської рослинної сировини: золототисячника (*Pentagium herba*) 18 мг; розмарину листя (*Rosmarini folium*) 18 мг; любистку кореня (*Levisticum radix*) 18 мг; допоміжні речовини: лактози моногідрат; повідон; крохмаль кукурудзяний; кремнію діоксид колоїдний безводний; магнію стеарат; оболонка капсули, що містить жовтий захід FCF (E 110), титану діоксид (E 171), желатин, чорнила чорні (у разі нанесення товарного знаку підприємства – ЗТ; містять шелак Glaze 45 % розчин в етанолі, заліза оксид чорний (E 172), пропіленгліколь, аміаку розчин концентрований).

Уролесан кр. фл. 25мл №1 – діючі речовини: 1 мл препарату містить ялиці олії (*oleum Abies*) – 67,60 мг; олії м'яти перцевої (*oleum Menthae piperitae*) – 16,90 мг; моркви дикої плодів екстракту рідкого (1:1) (*extractum fructuum Dauci sativi fluidum*) (екстрагент 96% етанол) – 194,35 мг; хмелю шишок екстракту рідкого (1:1) (*extractum fructuum Strobili lupuli fluidum*) (екстрагент 96% етанол) – 278,80 мг; материнки трави екстракту рідкого (1:1) (*extractum herbae Origani fluidum*) (екстрагент 96% етанол) – 192,95 мг; допоміжні речовини: динатрію едетат, рицинова олія.

Фарисіл табл. д/розсмокт. №20 апельсин – діючі речовини: хлоргексидин, бензокаїн; 1 таблетка містить хлоргексидину дигідрохлориду 5 мг, бензокаїну 5 мг; допоміжні речовини: маніт (E 421), целюлоза мікрокристалічна, повідон, магнію стеарат, натрію цикламат, сахарин натрію, ароматизатор апельсину або ароматизатор лимону, ароматизатор ментолу.

Фармазолін спрей назал. 1мг/мл фл. 10мл №1 м'ята евкаліпт – діюча речовина: ксилометазоліну гідрохлорид; 1 мл препарату містить ксилометазоліну гідрохлориду у перерахуванні на 100 % безводну речовину 1 мг; допоміжні речовини: олія евкаліпта; олія м'яти; бензалконію хлорид; динатрію едетат; пропіленгліколь; поліетиленгліколь 1500; повідон; гіпромелоза; полісорбат 20; натрію гідрофосфат, додекагідрат; калію дигідрофосфат; сорбіт (E 420); вода для ін'єкцій.

Фармацитрон пор. д/орал. р-ну пак. №10 – діючі речовини: парацетамол (ацетамінофен), фенілефрину гідрохлорид, феніраміну малеат, кислота аскорбінова; 1 пакет містить парацетамолу (ацетамінофену) 500 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, феніраміну малеату 20 мг, кислоти аскорбінової 50 мг; допоміжні речовини: натрію цитрат, кислота лимонна безводна, ароматизатор лимонний штучний, барвник жовтий D & C № 10 (E 104), барвник червоний FD & C № 40 (E 129), кремнію діоксид колоїдний, сахароза, цукор.

Фестал Нео 10000 табл. п/о №20 – діюча речовина: панстеатин;

1 таблетка містить панкреатину, що відповідає мінімальній ферментативній активності: 10 000 ліполітичних МО, 7 500 амілолітичних МО, 375 протеолітичних МО; допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, натрію проскармелоза, кросповідон, гіпромелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат; оболонка: поліетиленгліколь, суха суміш «Acryl-eze

white», що містить тальк, титану діоксид (E 171), метакрилатний сополімер, натрію лаурилсульфат, натрію карбонат, кремнію діоксид колоїдний безводний.

Фуросемід р-н д/ін. 1% амп. 2мл №10 – діюча речовина: furosemide;

1 мл розчину містить фуросеміду 10 мг; допоміжні речовини: натрію хлорид, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Фламідез табл. №30 – діючі речовини: парацетамол, диклофенак калію, серратіопептидаза; 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить: парацетамолу 500 мг, диклофенаку калію 50 мг, серратіопептидази у вигляді гранул з кишковорозчинним покриттям, які містять 15 мг серратіопептидази, що еквівалентно ферментній активності 30 000 ОД на 1 таблетку; допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна; крохмаль кукурудзяний; повідон (K-30); лактоза, моногідрат; гіпромелоза; поліетиленглікол (PEG 6000); титану діоксид (E 171); тальк; полісорбати (80); тартазин (E 102); опадрай білий 58901 (гіпромелоза; лактоза, моногідрат; титану діоксид (E 171); поліетиленгліколь; тальк); допоміжні речовини гранул серратіопептидази: натрію кроскармелоза, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, целюлоза мікрокристалічна.

Флоксал кр. оч. 0,3% фл. 5мл №1 – діюча речовина: офлоксацин;

1 мл розчину містить офлоксацину 3 мг; 1 крапля містить 0,1 мг офлоксацину; допоміжні речовини: бензалконію хлорид, кислота хлористоводнева, натрію гідроксид, натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Фурасол пор. 0.1г/пак. по 1,0г у пака. №5 – діюча речовина: фурагін розчинний; 1 пакетик містить фурагін розчинного 0,1 г; допоміжна речовина: натрію хлорид.

Хелпекс Антиколд НЕО Макс саше №10 малина – діючі речовини: парацетамол, левоцетиризину дигідрохлорид, фенілефрину гідрохлорид; 1 саше по 4 г містить парацетамолу 650 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, левоцетиризину дигідрохлориду 1,25 мг; допоміжні речовини: «Хелпекс® Антиколд неоМАКС» з малиновим смаком: кремнію діоксид колоїдний безводний, аспартам (E 951), маніт (E 421), цукралоза, цукроза, бетанін (E 162), ароматизатор малиновий.

Хелпекс Антиколд DX табл. №100 – діючі речовини: парацетамол, кофеїн, фенілефрину гідрохлорид, хлорфеніраміну малеат, декстрометорфану гідробромід; 1 таблетка містить парацетамолу 500 мг, кофеїну 30 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, хлорфеніраміну малеату 2 мг, декстрометорфану гідроброміду 10 мг; допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, целюлоза мікрокристалічна, повідон, тартазин (E 102), магнію стеарат, тальк, натрію крохмальгліколят (тип А), діамантовий блакитний (E 133).

Хлоргексидин 0,05% фл. 200 мл №1 – діюча речовина: хлоргексидину біглюконат; 100 мл розчину містять розчину хлоргексидину біглюконату 20 % – 0,25 мл; допоміжна речовина: вода очищена.

Цитрамон-Д табл. №6 – діючі речовини: ацетилсаліцилова кислота, парацетамол, кофеїн; 1 таблетка містить: ацетилсаліцилової кислоти 240 мг, парацетамолу 180 мг, кофеїну 30 мг;

допоміжні речовини: кислота лимонна моногідрат, крохмаль картопляний, повідон, какао, кальцію стеарат.

Діфлорс табл. 5мг/80мг №30 –діючі речовини: амлодипіну бесілат та валсартан; 1 таблетка містить амлодипіну бесілату 6,94 мг у перерахуванні на амлодипін 5 мг та 80 мг валсартану або амлодипіну бесілату 6,94 мг у перерахуванні на амлодипін 5 мг та 160 мг валсартану, або амлодипіну бесілату 13,88 мг у перерахуванні на амлодипін 10 мг та 160 мг валсартану; допоміжні речовини: кальцію гідрофосфат, дигідрат; целюлоза мікрокристалічна; натрію кроскармелоза; гідроксипропілцелюлоза; кремнію діоксид колоїдний безводний; тальк; магнію стеарат; покриття для нанесення оболонки Ora-Plus II White (поліетиленгліколь, спирт полівініловий, тальк, титану діоксид (E 171)).

Клопідогрель-Санofi табл. 75мг №30 –діюча речовина: клопідогрель; 1 таблетка містить клопідогрелью гідросульфату у формі основи 75 мг; допоміжні речовини: маніт (E 421), целюлоза мікрокристалічна, макрогол 6000, гідроксипропілцелюлоза низькозаміщена, олія рицинова гідрогенізована, Ora-Plus 32K14834, тип II (лактози моногідрат, гіпромелоза, титану діоксид (E 171), триацетин, заліза оксид червоний (E 172)), віск карнаубський.

Нітрогліцерин табл. сублінг. 0,5мг №40 Технолог – діюча речовина: 1 таблетка сублінгвальна містить нітрогліцерину 2 % на лактозі у перерахуванні на нітрогліцерин 0,5 мг; допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль прежелатинізований, целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, кальцію стеарат.

Беластезин табл. №10 – діючі речовини: бензокаїн, екстракт беладони густий; 1 таблетка містить бензокаїну – 300 мг, екстракту беладони густого (Belladonnae extractum spissum) – водно-спиртового ((4,8-5,2):1) (екстрагент 20 % (об/об) етанол) з вмістом 1,5 % суми алкалоїдів, у перерахунку на атропін – основу (гіосциамін) і суху речовину – 15 мг; допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, маніт (E 421), кальцію стеарат, коповідон.

Аскорбінова к-та др.0,05г №50 KB3 – діюча речовина: 1 драже містить кислоти аскорбінової (вітаміну С) 50 мг; допоміжні речовини: цукор, патока крохмальна, тальк, віск жовтий, олія мінеральна легка, ароматизатор «апельсиновий смак», барвник хіноліновий жовтий (E 104).

Нафтизин кр. назал. д/дор. скло 0,1% фл. 10мл №1 – діюча речовина: паразоліне; 1 мл препарату містить нафазоліну нітрату 0,5 мг або 1 мг; допоміжні речовини: борна кислота, вода для ін'єкцій. Олазол аер.60г – 10 шт діючі речовини: олія обліпихова, хлорамфенікол, бензокаїн, кислота борна; 1 балон містить: олії обліпихової – 5,40 г; хлорамфеніколу – 1,62 г; бензокаїну – 1,62 г; кислоти борної – 0,27 г; Допоміжні речовини: триетаноламін, ланолін, кислота стеаринова, гліцерин, вода очищена, хладон 134а.

Ципрофлоксацин кр. оч. 0,3% фл. 5мл №1 – діюча речовина: ciprofloxacin; 1мл розчину містить ципрофлоксацину 3 мг; допоміжні речовини: бензалконію хлорид; динатрію едетат (Трилон Б); натрію хлорид; вода очищена.

Ермігаль капс. 25000 №20 – діюча речовина: ransteatin; 1 капсула 25000 ОД містить панкреатину з підшлункової залози свиней з ферментативною активністю ліпази 25000 ОД, амілази 22500 ОД, протеази 1250 ОД; допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кросповідон, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, метакрилатного сополімеру дисперсія, триетилицитрат, тальк, симетикон, монтан-гліколевий віск, желатин, заліза оксид червоний (Е 172), заліза оксид чорний (Е 172), титану діоксид (Е 171), натрію

Кодесан ІС табл. №10 – 1 таблетка містить кодеїну фосфату гемігідрату (у перерахунку на кодеїну основу) 9,5 мг, термопсису екстракту сухого (Herba Theropsideis Lanceolatae) (1,23:1,0 екстрагент: 25 % етанол) 20 мг, солодки кореня (Licquitiiae radix) (подрібненого) 200 мг, натрію гідрокарбонату 200 мг; допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію кроскармелоза, целюлоза мікрокристалічна, желатин, кальцію стеарат.

Начальник ВМТЗ



Володимир ДЕРЕН